Vitis berlandieri Boutin B
VassV10R03s001-005 8011Mtp24 Collection Vassal-Montpellier Bedandsen Boutin B. 8011 Nrp 24 X Rg 3 D 1-10 9# 2008

ulaatanlaataalaataalaataal

Juntumhuda Juntumhuda







Désignation :

Berlandieri Bantin B.

VASSAL Cl 2 Planche 12 Côté A Nº 3 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Juntunlunti

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remer 6

Nº ardre

Juntunlanti Juntunlanti

Dégignation: Berlandien Bautin B.

VASSAL O & Planche I coté A Nº 3 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Crlenne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plant - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 Dégréeaux 5.

- 47 blanc b Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages prénzées 6 entièrement brenzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glaire 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cétonneux 9.
- 48 totalement i sillin 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 veleuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotenneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton fleral: gres 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morphelegiquement: mâle 4 hermaphredite 6 femelle 5.

Lewer 61

Ye ordre

Désignation s

Juntumhuntu

Berlandien Bouter B.

VASSAL Cl & Planche 12 côté No A 3 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raiss 2 - vert 3

ventre coloré (7) - à raiss 8 - vert 9.

52 - vrille : verte † - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel 60

Nº ordre

Berlandini Bantin B.

Désignation

Juntumlumb

VASSAL planche Mosté A Nº 3 souche 1 2 3 4 5. ce 21

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan () - en gouttière 2 - involuté 3.

révoluté 4 - tourmenté 5. 36 - Surface : unie 1 - ondulée @ finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

> 38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1. - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andreu le 20,6.58

Nº d'ordre : Désignation:
Emplacement: 2-12 A 3 4.5 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 9 x 24 - Lâche (- Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré (4 - non coloré 5. 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 5 irrégulière 8. (dimensions : 8 × 8). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1)- irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.) 29 - A section transversale : régulière (3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore 1 - coloré 2. 33 - A peau fine \$ - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - .. fidicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court A - moyen 5 - long 6. p2 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9. 33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Juntumlumin

Calvo85

```
Berlandieri Boutin B
Planche ..... côté ..... Rang 2.12.4.3. souche (1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                         autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée 🚱, côtelée 🚯.
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntumbanti

Remes 11/62

dantan lantan lantan lantau l

```
Nº d'ordre: .... Désignation: Berl. Boutin B.
Emplacement: 2-12A3 Vas.... Vign......
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - 2 - 4 - 5 - 6.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            : 1 - 2 - 3.
        Direction
           : 4 - 5.
        Forme
        Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntunlanti

Bonial 61

donted militaria da de la contrata d

s2 =

Formulaire de description 2/8

(stade floraison)

Année: 2009

Jandandand Jandandanda

Observateur: TD

Code cépage : 8011Mtp25 Code introduction : Nom introduction : berlandieri Chiendent

Emplacement: VassV10R03s011-

015

Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 1 - en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 1 très forte 9. oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 6 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 - cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 3 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 7 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 17- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées/1)- en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils couchés face inf. :nulle ou très faible 299 - faible 202 – moyenne 203 - très forte 204.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte D très forte 9.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 - plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 - très forte 219.

Densité poils dressés nervures face inf.: nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face sup.: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 3 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés face sup.: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup.: blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 -

plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Formulaire de description 4/8 (entre stades nouaison et véraison)

danimbontodintodenteri

Juntumlant

Année: Observateur: TD Code cépage: 8011 Code introduction: 24 Nom introduction: Berlandierie Bouten B Emplacement: VAR315 1-10 Feuille adulte oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9. oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5. oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5. oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5)- vert foncé 7. Luisan oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle D- point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4. oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle 15- point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4. oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente présente 9. oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente 1 - présente 9. oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre): nulle ou très faible 1 - faible 37 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. on 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente P- présente 9. oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente Ø- présente 9. Pétiole oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés: nulle ou très faible (1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9. Autre oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9. Vassal: Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré 1. [sinus pétiolaire : ouverture = 1-2-3-4-5-6 / forme = 0-accol.-V / dent = oui-non / dégarni = non-parfois-oui]

[sinus latéraux : ouverture = 1-2-3-4 / forme = U-accol.-V / dent = oui-non]

[dents : forme = concave-rectiligne-rectiligne&ronde-ronde-crochue / taille = 1-3-5-7-9 / courtes-moy-longues]

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 2006 7

Code cépage : Yould

Juntumland

Code introduction: 24

Nom introduction:

Berlandierie Bouten B

Emplacement: V10 R3 01-10

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles: absentes 1) - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence T - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence \$\mathbb{D}\$- présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue: 130 m

Observateur: TD

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3- moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue: 7 m

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »